

氨苯砞 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_A8_E8_8B_AF_E7_A0_9C_c22_310398.htm 药品名称氨苯砞 药物别名Diaminodiphenylsulfone，DDS 英文名称Dapsone 类别抗麻风病药 性状白色或类白色结晶或结晶性粉末；无臭，味微苦。在丙酮中易溶，在甲醇中溶解，在乙醇中略溶，在水中几乎不溶；在稀盐酸中溶解。制剂片剂：每片50mg；100mg。分子式成分药理及应用对麻风杆菌有抑制作用。口服吸收缓慢而完全，每日服用200mg，经过8日血药浓度平均 $2.3 \mu\text{g} / \text{ml}$ ， $t_{1/2}$ 因人而异，由10至50小时，平均为28小时，但在同一人身上，重复试验的结果是相等的。短半衰期者，口服本品每日50~100mg，其血浓度也可超过常需的最低抑菌浓度（MIC）。由于本品存在肠肝循环，所以半衰期较长，停药后可维持有效组织浓度2~3周。主要用于治疗各型麻风。近年试用本品治疗系统性红斑狼疮、痤疮、银屑病、带状疱疹等。用法用量治疗麻风病，口服，1次50~100mg，1日100~200mg。可于开始每日口服12.5~25mg，以后逐渐加量到每日100mg。由于本药有蓄积作用，故每服药6日后停药1日，每服10周停药2周。必要时可与利福平每日600mg，联合应用。儿童剂量1日1.4mg/kg。治疗红斑狼疮，1日100mg，连用3~6月；痤疮，1日50mg；银屑病或变应性血管炎，1日100~150mg；带状疱疹，1日3次，1次25mg，连服3~14日；糜烂性扁平苔癣，1日50mg，连用3个月。以上治疗中，均遵循服药6日，停药1日的原则。注重事项（1）常见的反应有恶心、呕吐等，偶见头痛、头晕、心动过速等。（2）血液系统反应有白细胞减少、粒细胞缺乏、贫血等。对于贫血，轻症可服用铁剂。严重

反应应及时停药。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏者，用本品可致正铁血红蛋白血症，严重者可致溶血性贫血。

（3）砷类化合物治疗麻风偶可引起麻风反应，常于用药后1~4周发生，特征是发热、不适、剥脱性皮炎、肝坏死并发黄疸、淋巴结肿大、贫血、正铁血红蛋白血症等，停药并给予皮质激素治疗可望好转。（4）中毒性精神病、四周神经炎等也偶发生。（5）肝、肾功能不全，贫血，胃和十二指肠溃疡病及有精神病史者慎用。（6）本品与磺胺类药物可有部分交叉过敏反应发生。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com