

盐酸硫利达嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E7_A1_AB_E5_c22_310410.htm 药品名称盐酸硫利达嗪
药物别名甲硫达嗪，美立廉 Mellaril 英文名称Thioridazine Hydrochloride
类别吩噻嗪类制剂片剂：25mg、50mg、100mg。药动学口服后T_{max}约3~4h，T_{1/2}约6~40h。适应症伴有焦虑、紧张、抑郁及躯体感觉异常的精神障碍。不良反应抗毒蕈碱反应和低血压反应；性功能失调多见。偶有视网膜毒性，过量可出现室性心律失常、心传导阻滞。参见盐酸氯丙嗪。相互作用可增强各种三环抗抑郁药的作用。用法用量口服，10mg~75mg/日，儿童每日0.5mg-2mg/kg，分次口服；可渐增至800mg/日，必须在密切监护下应用，连用不应超过4周。儿童严重行为障碍(如多动症等)：5岁以上，75mg~150mg/日。注重事项妊娠C类。参见盐酸氯丙嗪。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com