

盐酸氯丙嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_B0_AF_E4_c22_310416.htm 药品名称盐酸氯丙嗪
药物别名冬眠灵、氧普马嗪、可乐静 Wintermin 英文名
称Chlorpromazine Hydrochloride#093. 类别吩噻嗪类制剂片剂
：5mg、12.5mg、25mg，注射液：1ml：10mg、1ml：25mg
、2ml：50mg。冬眠合剂一号：5%葡萄糖注射液250ml内含氯
丙嗪、异丙嗪各50mg，哌替啶100mg。药理毒理为中枢多巴
胺受体的阻断剂，精神病人服用后，在不过分抑制情况下，
迅速控制精神分裂病症人的躁狂症状，减少或消除幻觉、妄
想，使思维活动及行为趋于正常。大剂量时又可直接抑制呕
吐中枢产生强大的镇吐作用，抑制体温调节中枢，使体温降
低，基础代谢降低，器官功能活动减少，耗氧量减低而呈人
工冬眠状态。能增强催眠、麻醉、镇静作用。可阻断外周
肾上腺素受体、直接扩张血管，引起血压下降，大剂量时可
引起位置性低血压应注重。可降低心脏的前负荷，而改善心
脏功能(尤其是左心功能衰竭)对内分泌系统有一定影响。药
动学口服吸收不规则，个体差异大，T_{max}约2~4h，脑中浓
度比血中浓度高，PB约95%；主要在肝内代谢，由尿排出
，T_{1/2}约10~30h。适应症精神分裂症、躁狂抑郁症的躁狂期
、激动攻击行为和焦虑紧张状态。也用于呕吐、顽固性呃逆
等。不良反应常见有嗜睡、乏力和植物神经功能失调所致的
口干、心悸、便秘、视力模糊、排尿困难。大剂量时可产生
锥体外系反应如静坐不能、震颤、流涎等。注射给药可引起
体位性低血压。偶见心律失常、肝功能异常及黄疸。变态反
应有皮疹、粒细胞减少等。眼部并发症有角膜及晶体混浊，

偶见色素沉着性视网膜病。长期用药可出现乳溢、排卵延迟、男子女性型乳房、体重增加、高血糖和糖耐量改变。相互作用可加重乙醇、全身麻醉药、镇静催眠药和阿片类药物等的中枢抑制作用。本品会降低胍乙啶及其它肾上腺素能神经元阻断剂的抗高血压作用，会加重其它抗毒蕈碱药物的不良反应。同用甲氧氯普胺可加重锥体外系反应。合用延长Q-T间期的抗心律失常药易引起室性心律失常。用法用量精神病：口服，25mg~50mg/次，2~3次/日，渐增量至400mg~600mg/日，维持量：100mg~300mg/日。镇吐和顽固性呃逆，12.5mg~50mg/次，3~4次/日。可深部肌肉注射25mg~50mg。老人、儿童及体弱者，开始用成人量的1/3~1/2，以后酌情缓慢增加 注重事项妊娠C类。妊娠、哺乳期妇女禁用。肝肾功能不良、前列腺肥大、帕金森病、心血管系统疾病、青光眼、糖尿病、甲状腺功能低下、有癫痫病史、过敏史及骨髓造血功能不良者禁用。长期服药可出现多巴胺受体超敏症状(迟发性运动障碍)，抗胆碱药可使之加重，宜减低剂量或考虑停药。长期用药后忽然撤药可出现类似戒断症状样反应，宜逐渐减量停药。用药者应避免驾车或操作器械。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com