

氟康唑片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_9F_E5_BA_B7_E5_94_91_E7_c22_310445.htm 药品名称氟康唑片药

物别名三维康 英文名称Fluconazole 类别抗真菌药制剂片剂

: 50MG。分子式成分 化学名: 2-(2, 4-二氟苯基)-1, 3-双(1, 2, 4-三唑-1-基)-2-丙醇。药理毒理本药为新型三唑类抗真菌药物，有广谱抗真菌作用，对真菌细胞色素P-450依靠酶的抑制作用具有高度选择性，能选择性地抑制真菌的甾醇合成。口服及静注对多种真菌感染动物模型有效。适应症全身性念珠菌病，隐球菌病，粘膜念珠菌病，急性或复发性阴道念珠菌病。接受化疗或放疗而轻易发生真菌感染的白血病患者及其它恶性肿瘤病人的预防和治疗。皮肤真菌病，如体癣、股癣、花斑癣及皮肤念珠菌感染。不良反应恶心、腹痛、腹泻及胃肠胀气。一过性肝酶升高。皮肤反应如皮疹，如发现大疱损害或多形红斑，应停止用药。相互作用与香豆素类药物合用时，凝血酶原时间可延长，故应注重调节抗凝药的剂量。本药可延长同时服用的磺脲类药物(氯磺丙脲，优降糖，吡磺环己脲及甲糖宁)的血清半衰期，故应注重可能出现的低血糖反应。与双氢律噻嗪等利尿剂合用，本药的血浓度可能增加。与苯妥英合用时，苯妥英的血浓度增加，故应调整其剂量。与利福平同时服用，会使本药的曲线下面积减少25%，半衰期缩短20%，故应考虑增加本药的剂量。与环孢素合用，可使环孢素的浓度缓慢增加。与茶碱合用时，茶碱的平均血浆清除率降低。用法用量口服或静脉滴注，成人，念珠菌及皮肤真菌病，50mg~100mg/次，1次/日。阴道念珠菌病150mg/次，1次/日。隐球菌脑膜炎及其它部位感染，首

日400mg，随后200mg～400mg/日。儿童(>3岁)，表面念珠菌感染，每日1mg～2mg/kg；全身念珠菌及隐球菌感染每日3mg～4mg/kg，1次/日。注重事项对氟康唑或其它三唑类药物过敏者禁用。注重监测肝功能。对妊娠和哺乳的影响在动物实验中，发现高剂量对胎儿有不良反应，这与母体之毒性有关，但这不表示与服用治疗剂量有关，不过，除非是利大于弊的情况下，妊娠妇女不推荐使用。目前尚未有母乳中氟康唑浓度的资料，故不推荐哺乳妇女使用。对儿童的影响16岁以下儿童慎用，不推荐1岁以下婴儿应用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com