

舒林酸〔基〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E8\\_88\\_92\\_E6\\_9E\\_97\\_E9\\_85\\_B8\\_E3\\_c22\\_310500.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E8_88_92_E6_9E_97_E9_85_B8_E3_c22_310500.htm) 药品名称舒林酸〔基〕  
药物别名奇诺力、枢力达片 Clinoril 英文名称Sulindact〔 〕  
类别抗炎镇痛药制剂片剂：0.1g、0.2g。药理毒理本品为非甾体炎抗炎药，口服吸收后在体内代谢转化为硫化物，该硫化物才具有显著的消炎和镇痛作用，对胃肠道刺激性较小本品还能抑制5-羟色胺的释放，以及抑制胶原诱发的血小板聚集作用，延长出血时间药动学口服后约90%被吸收， $t_{1/2}$ 为7h~8h，代谢物的 $t_{1/2}$ 为16h~18h。适应症风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎等，也用于滑囊炎、腱鞘炎和急性痛风性关节炎的短程治疗。不良反应常见恶心、呕吐、便秘、腹痛等，偶见胃出血、眩晕、头痛、皮疹、瘙痒及发热等。相互作用与阿司匹林并用降低本品的硫化代谢物，降低疗效；能增强甲氨蝶呤、环孢素的毒性。用法用量口服，与食物同时服，关节炎、强直性脊柱炎100mg~200mg/次，2次/日，7日为1疗程；幼年型类风湿性关节炎开始每日4.5mg/kg，分2次服，必要时可增至每日6mg/kg，维持量每日4.5mg~6mg/日。注重事项妊娠期B类（分娩期D类）。活动性胃肠道出血患者及对阿斯匹林过敏者禁用，肝功能异常、肾结石者及孕妇、哺乳期妇女和2岁以下婴幼儿慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)