

灰黄霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E7\\_81\\_B0\\_E9\\_BB\\_84\\_E9\\_9C\\_89\\_E7\\_c22\\_310508.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_81_B0_E9_BB_84_E9_9C_89_E7_c22_310508.htm) 药品名称灰黄霉素 英文名称Griseofulvin (GRIVULFIN) 类别抗真菌药性状白色或类白色细微粉末；无臭，味微苦。在二甲基甲酰胺中易溶，在无水乙醇中微溶，在水中极微溶解。对热稳定。制剂片剂：每片0.1g；0.25g。外用霜膏（商品名癣净）：每支10g。分子式成分药理及应用对各种皮肤癣菌如小孢子菌属、红色癣菌、黄癣菌等都有抑制作用。本品吸收后沉积在上皮的角蛋白层中，并渗透入毛囊，从而能消除真菌感染。临床上主要用于头癣、严重体股癣、叠瓦癣、手足甲癣等，对头癣的疗效较明显。某些病例可能复发，但再治仍可奏效。对指甲癣常需服药数月方能见效，故以采用其他药物治疗为宜。对带状疱疹也有一定的治疗作用。用法用量口服，1次0.2~0.25g，1日0.8~1g。通常，开始可用大量，1日量为1g，显效后减为250~500mg，饭后服，疗程20~30日，同时合并外用杀真菌药。小儿1日量15~20mg/kg，分3~4次服。注重事项（1）不良反应较多，常见有食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、头痛、嗜睡、倦怠、皮肤瘙痒、皮疹、荨麻疹，尚有色素沉着、药物热、关节痛等。部分病人可出现白细胞减少（偶见增加）、粒细胞减少、蛋白尿、氨基转移酶活性升高、BSP排泄时间延长、光敏性皮炎、心动过速等，还可出现神经精神系统症状，如抑郁、失眠、精神错乱、四周神经炎，以及味觉失常、耳鸣、视力障碍、男子乳房女性化等。（2）宜在饭后服用，油类食品有助于吸收。（3）应用本品期间忌饮酒，因本品可使乙醇作用加强。（4）有酶促作用，可使华法

林的抗血凝作用减弱。（5）与巴比妥类联用，本品的作用减弱。（6）有较强的肝毒性，应用期间定期检查肝、肾功能和血象。（7）肝功能不全者慎用，孕妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)