

吡罗昔康 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022_E5_90_A1_E7_BD_97_E6_98_94_E5_c22_310513.htm 药品名称吡罗昔康药物别名炎痛喜康，FELDEEN 英文名称Piroxicam 类别抗炎镇痛药性状类白色或微黄绿色的结晶性粉末，无臭，无味。在氯仿中易溶，在丙酮中略溶，在乙醇或乙醚中微溶，在水中几乎不溶；在酸中溶解，在碱中略溶。熔点198 ~ 202 。制剂片（胶囊）剂；每片（胶囊）10mg；20mg。注射液：每支20mg（2ml）。分子式成分药理及应用为抗炎镇痛药，其作用略强于吲哚美辛。用于治疗风湿性及类风湿性关节炎，有明显的镇痛、抗炎及一定的消肿作用，近期有效率达85%以上，副作用较稍微。有报道其疗效优于吲哚美辛、布洛芬及萘普生。其抗炎作用可能部分由于抑制前列腺素合成所致。其特点为服量小，每日20mg，4 ~ 7日可达稳态血浓度。t_{1/2}为45小时，长期服用不致产生蓄积作用。主要经肝脏代谢，以羟化产物及与葡萄糖醛酸结合物形式自尿排出，仅5%以原形自尿粪排出。用法用量口服，抗风湿，1日20mg；抗痛风，1日40mg，连续4 ~ 6日。肌内注射，1次10 ~ 20mg，1日1次。注意事项（1）偶见头晕、浮肿、胃部不适、腹泻或便秘、粒细胞减少、再生障碍性贫血等，停药后一般可自行消失。（2）本品不宜长期服用，长期服用可引起胃溃疡及大出血。如需长期服药，应注重血象及肝肾功能，并注重大便色泽有无变化，必要时进行大便隐血试验。（3）对本品过敏、胃与十二指肠溃疡患者、儿童及孕妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com