

蔡普生 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E8\\_90\\_98\\_E6\\_99\\_AE\\_E7\\_94\\_9F\\_c22\\_310537.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E8_90_98_E6_99_AE_E7_94_9F_c22_310537.htm) 药品名称蔡普生药物别名甲氧萘丙酸，消痛灵，NAPROSYN 英文名称Naproxen 类别抗炎镇痛药性状白色或类白色结晶性粉末；无臭或几乎无臭。在甲醇、乙醇或氯仿中溶解，在乙醚中略溶，在水中几乎不溶。制剂片剂：每片0.1g；0.125g；0.25g。胶囊剂：每胶囊0.125g；0.2g；0.25g。注射液：每支100mg（2ml），200mg（2ml）。栓剂：每粒0.25g。分子式成分药理及应用本品有抗炎、解热、镇痛作用为PG合成酶抑制剂。口服吸收迅速而完全，1次给药后2~4小时血浆浓度达峰值，在血中99%以上与血浆蛋白结合， $t_{1/2}$ 为13~14小时。约95%自尿中以原形及代谢产物排出。对于类风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊柱炎、痛风、运动系统（如关节、肌肉及腱）的慢性变性疾病及轻、中度疼痛如痛经等，均有肯定疗效。中等度疼痛可于服药后1小时缓解，镇痛作用可持续7小时以上。对于风湿性关节炎及骨关节炎的疗效，类似阿司匹林。对因贫血、胃肠系统疾病或其他原因不能耐受阿司匹林、吲哚美辛等消炎镇痛药的病人，用本药常可获满足效果。可安全地与皮质激素合用，但与皮质激素合用时，疗效并不比单用皮质激素时好。本品与水杨酸类药物合用也不比单用水杨酸类好。此外，阿司匹林可加速本品的排出。贮存密闭、避光保存。用法用量1次0.2~0.3g，1日2~3次。可口服，开始每日剂量0.5~0.75g，维持量每日0.375~0.75g，分早晨及傍晚2次服用。轻、中度疼痛或痛经时，开始用0.5g，必需时经6~8小时后再服0.25g，日剂量不得超过1.25g。肌肉注射，1次100~200mg

，1日1次。栓剂直肠给药，1次0.25g，1日0.5g。注重事项（1）长期服用耐受良好，副作用主要为胃肠道轻度和暂时不适。偶见恶心、呕吐、消化不良、便秘、胃肠道出血、失眠或嗜睡、头痛、头晕、耳鸣、瘙痒、皮疹、血管神经性水肿、视觉障碍及出血时间延长，一般不需中断治疗。（2）与阿司匹林等非甾体抗炎药有交叉过敏反应，禁用于对本品及对阿司匹林过敏的患者。（3）对伴有消化性溃疡或有消化性溃疡病史者慎用；对有活动性胃及十二指肠溃疡患者应在严格监督下使用。（4）本品可加强双香豆素的抗凝血作用。（5）与丙磺舒合用时可增加本品的血浆水平及明显延长本品的血浆 $t_{1/2}$ 。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)