

氟奋乃静 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_9F_E5_A5_8B_E4_B9_83_E9_c22_310540.htm 药品名称氟奋乃静药

物别名氟非拉嗪，PERMIFIL，Prolixin 英文名称Fluphenazine 类别抗痛风药性状常用其盐酸盐，为白色或类白色结晶性粉末；无臭，味微苦；遇光易变色。在水中易溶，在乙醇中略溶，在丙酮中微溶，在苯或乙醚中不溶。制剂片剂：每

片2mg；5mg。注射液：2mg（1ml）；5mg（2ml）。分子式

成分药理及应用抗精神病作用比奋乃静强，且较久。镇静、降低血压作用微弱，但锥体外系反应比奋乃静更多见。适用于妄想、紧张型精神分裂症。其癸酸酯或庚酸酯针剂有长效作用，详见本节长效抗精神病药。用法用量口服：1次1

~10mg，1日10~30mg。或遵医嘱。注重事项（1）用药后轻易出现锥体外系反应，如两眼斜视或向外上方固定、肢体扭转、角弓反张、颈部强直、斜颈、静坐不能、抽搐、舌根发硬等运动障碍，用药时可考虑同时用抗震颤麻痹药（如苯海索、阿托品、东莨菪碱等），以预防或减少副作用发生。如出现锥体外系反应时，可立即注射东莨菪碱，或口服苯海索或阿托品。（2）本药用量最好从小剂量开始，逐步增加。

（3）在处理恶心、呕吐、头晕、晕车等反应时，一般宜采用抗焦虑药如氯氮、安定等。尽量少用本品。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com