

酮洛芬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E9_85_AE_E6_B4_9B_E8_8A_AC_c22_310550.htm 药品名称酮洛芬药物别名酮基布洛芬，优洛芬，PROFENID 英文名称Ketoprofen 类别抗炎镇痛药性状白色结晶性粉末；无臭或几乎无臭。在甲醇中极易溶，在乙醇、丙酮或乙醚中易溶，在水中几乎不溶。熔点约93~96℃。制剂肠溶胶囊：每胶囊25mg；50mg。分子式成分药理及应用为芳基烷酸类化合物。具有镇痛、消炎及解热作用。消炎作用较布洛芬为强，副作用小，毒性低。口服易自胃肠道吸收。1次给药后，约0.5~2小时可达血浆峰浓度。t_{1/2}为1.6~1.9小时。在血中与血浆蛋白结合力极强。在24小时内自尿中的排出率为30%~90%。主要以葡萄糖醛酸结合物形式排出。用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎、骨关节炎、关节强硬性脊椎炎及痛风等。用法用量口服：每次50mg，1日150mg。3~4次；或开始每次100mg，1日3次，以后改为1日2次。为避免对胃肠道刺激，应饭后服用，整个胶囊吞服。注重事项不良反应与布洛芬相似而较轻，一般易于耐受。主要为胃肠道反应。少数人出现嗜眠、头痛、心悸等。胃与十二指肠溃疡患者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com