

头孢羟氨苄〔典〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E7\\_BE\\_9F\\_E6\\_c22\\_310563.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E7_BE_9F_E6_c22_310563.htm) 药品名称头孢羟氨苄〔典〕 英文名称Cefadroxil 类别四代头孢性状白色或类白色结晶性粉末，有特异性臭味。在水中微溶，在乙醇、氯仿或乙醚中几乎不溶。5%水溶液的pH为4~6。在弱酸性条件下稳定。制剂胶囊剂：每胶囊0.125g；0.25g。分子式成分为半合成的第一代口服头孢菌素。药理及应用本品的作用类似头孢氨苄，对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、肺炎克雷白杆菌等有抗菌作用。本品口服吸收良好，受食物的影响小，口服0.5g或1g后，平均血药峰浓度分别为16或28  $\mu\text{g}/\text{ml}$ 。体内有效浓度维持较久，用药12小时尚可测出。有90%以上的药物由尿呈原形排出，1次口服0.5g，尿药峰浓度可达1800  $\mu\text{g}/\text{ml}$ ，有效浓度可维持20小时。临床应用本品于呼吸道、泌尿道、咽部、皮肤等部位的敏感菌感染。用法用量成人平均用量：1日1~2g，分2~3次口服，泌尿道感染时，也可1次服下。小儿1日量50mg/kg，分两次服。肾功能不全者，首次服1g，以后按肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率为25~50ml/分者，每12小时服0.5g；10~25ml/分者，每24小时服0.5g；<10ml/分者，每36小时服0.5g。注重事项参见头孢氨苄。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)