

溴哌利多 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_BA_B4_E5_93_8C_E5_88_A9_E5_c22_310587.htm 药品名称溴哌利多药物别名Impromen 英文名称Bromperidol 类别定酰苯类制剂片剂：每片1mg；3mg；6mg。颗粒剂：1%。分子式成分药理及应用本品为丁酰苯类抗精神病药。可对抗阿扑吗啡、苯丙胺的作用，对条件回避反应有抑制作用；但对强直性昏厥作用弱。实验证实，本品具有促进脑内多巴胺代谢和阻断脑内多巴胺受体的作用，这与其抗精神病作用有关。本品口服可吸收，且吸收较迅速，4~6小时后达血高峰浓度，血浆半衰期为20.2~30.0小时。经肝脏与葡萄糖醛酸结合，自肾脏排出。本品适用于治疗精神分裂症。用法用量口服：通常成人每日3~18mg，分次服用，根据病情或年龄可调整剂量，最大剂量每日36mg。注重事项（1）本品主要副作用为帕金森氏综合征、静坐不能、睡眠障碍、困倦、便秘、乏力、倦怠，偶见ALT升高。（2）本品禁用于昏迷、使用中枢抑制药者、重症心功能不全者、帕金森氏征患者、对丁酰苯类过敏者、孕妇、哺乳期妇女。（3）肝功不良、心血管系统疾病、低血压或有过一过性低血压的患者，有癫痫或痉挛性疾病既往史者，甲状腺机能亢进、高龄患者及小儿等慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com