

吲哚美辛 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_B2\\_E5\\_93\\_9A\\_E7\\_BE\\_8E\\_E8\\_c22\\_310595.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_90_B2_E5_93_9A_E7_BE_8E_E8_c22_310595.htm) 药品名称吲哚美辛药物别名消炎痛，Indomethacin，INTEBEN，INDOCIN 英文名称Indometacin 类别抗炎镇痛药性状类白色或微黄色结晶性粉末；几乎无臭，无味。在丙酮中溶解，在甲醇、乙醇、氯仿或乙醚中略溶，在苯中微溶，在甲苯中极微溶解，在水中几乎不溶。熔点：158～162℃。制剂肠溶片剂：每片25mg。胶囊剂：每胶囊25mg。胶丸：每丸25mg。栓剂：每粒25mg；50mg；100mg。控释胶囊：每胶囊25mg；75mg。乳膏剂：每支100mg（10g）。涂擦按摩患处，一日2～3次。分子式成分药理及应用通过抑制体内前列腺素（PG）合成而产生解热、镇痛及消炎作用。作用强。（1）解热作用、缓解炎性疼痛作用明显，用于急、慢性风湿性关节炎、痛风性关节炎及癌性疼痛。也可用于滑囊炎、腱鞘炎及关节囊炎等。（2）抗血小板聚集，可防止血栓形成，但疗效不如阿司匹林。（3）治疗Behcet综合征，退热效果好；用于Batter综合征，效尤显著。（4）用于胆绞痛、输尿管结石症引起的绞痛；对偏头痛也有一定疗效，也可用于月经痛。口服吸收迅速、良好，在血浆中与蛋白结合率约90%，在肝内部分代谢，排泄快。t<sub>1/2</sub>为7～12小时。用法用量开始时每次服25mg，一日2～3次：饭时或饭后立即服（可减少胃肠道副作用）。治疗风湿性关节炎等症时，如未见副作用，可逐渐增至每日100～150mg，分3～4次服用。现亦采用胶丸或栓剂剂型，使胃肠道副作用发生率降低，栓剂且有维持药效时间较长的特点，直肠给药，1次50mg，一日50～100mg，一般连用10日为1疗程。控释胶囊：

每日1次，每次75mg，或1次25mg，每日2次。必要时1次75mg，每日2次。注重事项（1）常见副作用为胃肠道反应（恶心、呕吐、腹痛、腹泻、溃疡，有时并引起胃出血及穿孔）。饭后服用本品胶囊剂可减少胃肠道反应。（2）中枢神经系统症状（头痛、眩晕等）的发生率不低（20%~50%），若头痛持续不退，应停药。（3）可引起肝功能损害（黄疸、氨基转移酶升高）。（4）抑制造血系统（粒细胞减少等，偶有再生障碍性贫血）。（5）过敏反应：常见的有皮疹、哮喘。与阿司匹林有交叉过敏性，对后者过敏者不宜用本品。（6）有报道，与氨苯蝶啶合用可引起肾功能损害。（7）溃疡病、震颤麻痹、精神病、癫痫、支气管哮喘患者，肾功能不全者以及孕妇忌用。儿童对本品较敏感，有用本品后因激发潜在性感染而死亡者，故儿童亦慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)