

美帕曲星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_BE_8E_E5_B8_95_E6_9B_B2_E6_c22_310608.htm 药品名称美帕曲星药物别名克霉灵，甲帕霉素，Montricin 英文名称Mepartricin 类别抗真菌药制剂肠溶片：每片50000单位。阴道片：每片25000单位。乳膏：供粘膜用。药理及应用为抗深部真菌药，对白色念珠菌有较强的抑制作用，其作用类似两性霉素B，与霉菌细胞膜的甾醇结构结合而破坏膜的通透性。十二烷基硫酸钠促进美帕曲星透过肠膜吸收进入血流，被吸收的药物在肾脏内有较高的浓度，并由尿液排泄，对阴道真菌感染有效。未吸收的药物则由粪便排出体外。还对滴虫有抑制作用。用于白色念珠菌阴道炎和肠道念珠菌病，也可用于阴道或肠道滴虫病。本品在肠道内与甾醇类物质结合成不吸收的物质，可用于治疗良性前列腺肿大。用法用量阴道或肠道念珠菌感染或滴虫病（用含十二烷基硫酸钠的复合片）：1次100000单位（2片），每12小时1次，连用3日为1疗程，对于复杂性病例，疗程可酌延长。宜食后服用。治疗前列腺肿大或肠道念珠菌病、滴虫病（用不含十二烷基硫酸钠的片剂）：每日1次，每次100000单位。注重事项主要有胃肠道反应，如恶心、腹胀气等不良反应。食后服用反应较轻。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com