

土的宁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9C\\_9F\\_E7\\_9A\\_84\\_E5\\_AE\\_81\\_c22\\_310627.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_9C_9F_E7_9A_84_E5_AE_81_c22_310627.htm) 药品名称土的宁 药物别名（番木鳖碱，土的年） 英文名称Strychnine 类别中枢兴奋药 性状硝酸土的宁为无色针状结晶或白色结晶性粉末；无臭，味极苦。在沸水中易溶，在水中略溶，在乙醇或氯仿中微溶，在乙醚中几乎不溶。制剂注射液：每支1mg（1ml）；2mg（1ml）。片剂：每片1mg。药理及应用对脊髓有选择性兴奋作用，可提高骨骼肌的紧张度。对大脑皮层亦有一定兴奋作用。用于巴比妥类药物中毒，效不及贝美格且不安全。用于偏瘫、瘫痪及因注射链霉素引起的骨骼肌松弛、弱视症等。本品因安全范围小，现已少用。用法用量常用量：皮下注射，1次1~3mg。口服，每次1~3mg，1日3次；对抗链霉素引起的骨骼肌松弛，每次1mg，每日1次。极量：皮下注射，1次5mg。注重事项（1）过量易产生惊厥。（2）本品排泄缓慢，有蓄积作用，故使用时间不宜太长。如出现惊厥，可立即静注戊巴比妥钠0.3~0.4g以对抗，或用大量的水合氯醛灌肠。如呼吸麻痹，须人工呼吸。口服本品中毒时，待惊厥控制后，以0.1%高锰酸钾液洗胃。（3）吗啡中毒，因脊髓处于兴奋状态，慎用本品解救。高血压、动脉硬化、肝肾功能不全、癫痫、破伤风、突眼性甲状腺肿病人忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)