

盐酸洛贝林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_B4\\_9B\\_E8\\_c22\\_310661.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_B4_9B_E8_c22_310661.htm) 药品名称盐酸洛贝林  
药物别名祛痰碱、山梗菜碱，祛痰菜碱，半边莲碱、北美山梗菜碱 英文名称Lobeline Hydrochloride#093. 类别中枢兴奋药  
制剂注射液：1ml：3mg、1ml：10mg。为无色或几乎无色的澄明液体。分子式成分化学名为2-[1-甲基-6-(2-羟基苯乙基)-2-哌啶基]苯乙酮盐酸盐。分子式：C<sub>22</sub>H<sub>27</sub>NO<sub>2</sub>HCl。分子量：373.92 药理毒理能选择性地兴奋颈动脉体化学感受器，反射地兴奋呼吸中枢，大剂量也能直接兴奋呼吸中枢。可刺激颈动脉窦和主动脉体化学感受器（均为N<sub>1</sub>受体），反射性地兴奋呼吸中枢而使呼吸加快，但对呼吸中枢并无直接兴奋作用。对迷走神经中枢和血管运动中枢也同时有反射性的兴奋作用；对植物神经节先兴奋而后阻断药 药动学维持时间约1h。适应症新生儿窒息、吸入麻醉药及其它中枢抑制药如吗啡或巴比妥类中毒、一氧化碳引起的窒息以及肺炎、白喉等传染病引起的呼吸衰竭。不良反应恶心、呕吐、腹泻、头痛、眩晕和震颤。剂量过大可引起出汗、心动过速、呼吸抑制、血压下降、体温下降、强直性阵挛性惊厥及昏迷。用法用量肌注或皮下注射，成人3mg～10mg/次，极量20mg/次；小儿1mg～3mg/次。缓慢静注：成人3mg/次，极量6mg/次。儿童0.3mg～3mg/次。必要时每隔30min可重复1次。注意事项肌注或皮下注射，成人3mg～10mg/次，极量20mg/次；小儿1mg～3mg/次。缓慢静注：成人3mg/次，极量6mg/次。儿童0.3mg～3mg/次。必要时每隔30min可重复1次。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)