

氟莫头孢 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_9F\\_E8\\_8E\\_AB\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_c22\\_310690.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_9F_E8_8E_AB_E5_A4_B4_E5_c22_310690.htm) 药品名称氟莫头孢  
药物别名Flumarin 英文名称Flomoxef 类别四代头孢制剂注射剂：每支0.5g；1g。药理毒理本品的显著特点是它对各种革兰阳性和阴性菌都具有极好的抗菌活性。对革兰阳性菌，尤其是对MRSA具有很好的抗菌作用，为其它第3代头孢菌素所不及。对革兰阴性菌，如大肠杆菌、肺炎克雷伯杆菌、奇异变形杆菌、普通变形杆菌、雷极普罗威登斯菌、摩氏摩根菌、流行性感嗜血杆菌和产酶的卡他莫拉菌等均具有很高的抗菌活性，可与其它第3代头孢菌素媲美。但对临床分离出的阴沟杆菌、枸橼酸杆菌属、粘质沙雷菌抗菌作用稍弱，对绿脓杆菌无效。对厌氧菌的抗菌活性优于其它头孢菌素。药动学正常人肌注本品0.5g或1g，血药峰浓度分别为13.5mg/L和24.7 mg/L，半衰期为80min；静注半衰期为45min。给药后12h内尿中回收率为80%~90%。适应症金黄色葡萄球菌（包括MRSA）及其它敏感菌引起的各种感染：败血症，心内膜炎，各种外科手术后感染，上呼吸道、肺部、胆道、腹腔、泌尿生殖系统、耳鼻咽喉感染。不良反应发生率约1.8%，主要为发热、皮疹、荨麻疹、关节痛等过敏症状，偶有暖气、腹泻，AST、ALT、ALP、BUN升高，嗜酸粒细胞增多，血小板减少；中性粒细胞减少。罕见休克症状。用法用量静注或静滴：成人每日1~2g，重症者4g，分2次；儿童每日60~80mg/kg，分3~4次。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)