

司他夫定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_8F_B8_E4_BB_96_E5_A4_AB_E5_c22_310706.htm 药品名称司他夫定

英文名称Stavudine 类别抗病毒药制剂胶囊剂，25mg/粒

，40mg/粒。分子式成分 化学名：1-（5-Hydroxymethyl-2

，5-dihydro-furan-2-yl）-5-methyl-1H-pyrimidine-2，4-dione。

适应症HIV感染，可用于不能耐受齐多夫定或对齐多夫定反应不佳的患者，也可用于治疗3个月至12岁的儿童HIV感染患者。

不良反应主要不良反应为外周神经炎，发生率与剂量相关。每日剂量为0.1mg/kg、0.5mg/kg及2.0mg/kg，发生率分别为6%、17%及31%，此不良反应限制了本品的应用。其次

为ALT及AST轻度到中度上升，其它不良反应有头痛、寒战、

发热、腹泻及皮疹。具有神经毒性不良反应的药物与本品联用，可能会增加神经毒性，须慎用；对本品过敏者禁用 用法

用量口服。体重超过60公斤成人推荐剂量40mg(bid)，体重低于60公斤成人推荐剂量30mg(bid)，两次服药间隔12小时。3个月

龄以上、体重低于30公斤的儿童推荐剂量每公斤体重1mg(bid)，体重超过30公斤儿童推荐成人剂量，肾损害者相应

减少剂量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com