

尼可刹米 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_B0_BC_E5_8F_AF_E5_88_B9_E7_c22_310708.htm 药品名称尼可刹米药物别名（可拉明，二乙烟酰胺，CORAMINE）英文名称Nikethamide 类别中枢兴奋药性状无色或淡黄色的澄明油状液体，放置冷处，即成结晶；有稍微的特臭，苦味；有引湿性。能与水、乙醇或乙醚任意混合。制剂注射液：每支0.375g（1.5ml）.0.5g（2ml）。分子式成分药理及应用选择性地兴奋延髓呼吸中枢，也可作用于颈动脉体和主动脉体化学感受器反射性地兴奋呼吸中枢，使呼吸加深加快。对血管运动中枢有微弱兴奋作用。一次静注作用维持5~10分钟。用于中枢性呼吸及循环衰竭、麻醉药及其它中枢抑制药的中毒。对阿片类药物中毒的解救效力较成四氮好，对吸入麻醉药中毒次之，对巴比妥类药中毒的解救不如印防己毒及戊四氮。口服、注射吸收好。不良反应不良反应少见。大剂量可引起血压升高、心悸、出汗、呕吐、震颤及肌僵直，应及时停药以防惊厥。用法用量常用量：皮下注射、肌肉或静脉注射，每次0.25~0.5g。极量：皮下、肌肉或静脉注射，一次1.25g。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com