

盐酸吗啉胍 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_90\\_97\\_E5\\_c22\\_310727.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E5_90_97_E5_c22_310727.htm) 药品名称盐酸吗啉胍药物别名吗啉咪胍、盐酸吗啉双胍、病毒灵、吗啉胍

Morpholinebiguanide，ABOB 英文名称Moroxydine 类别抗病毒药制剂片剂。0.1g。糖浆剂：5%。吗啉胍滴眼剂：3%。吗啉胍注射剂：(1)50mg：1mL (2)100mg：2mL。分子式成分化学名：(2-吗啉-2-亚胺甲基)胍。分子式：C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>N<sub>5</sub>O。分子量：171.22。性状：本品盐酸盐为白色结晶性粉末，无臭，味微苦。易溶于水，微溶于乙醇、乙醚，不溶于氯仿。熔点为205-210 (分解)。药理毒理本品为广谱抗病毒药，对流感病毒等多种病毒增殖期的各个环节都有作用。适应症呼吸道感染、流感、流行性腮腺炎、水痘、疱疹及扁平疣等治疗不良反应可引起出汗及食欲不振等反应。相互作用抗组胺药，维生素B<sub>1</sub>、维生素C可增强本品的疗效，减轻不良反应。板蓝根与本品联用可提高疗效，两药联用有协同作用。用法用量片剂糖浆剂：口服，成人0.1g~0.2g/次，3次/日；小儿每日10mg/kg，分3次服用。滴眼剂：每1~2小时1次。肌肉注射：每次100mg，一日1-2次。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)