

氟哌利多 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_9F_E5_93_8C_E5_88_A9_E5_c22_310729.htm 药品名称氟哌利多药

物别名氟哌啉，哌罗哌丁苯，哌哌啉醇，Dridol，Inapsine 英文名称drop.eridol 类别丁酰苯类制剂注射液：每支5mg

（1ml）。分子式成分药理及应用药理作用与氟哌啉醇基本相同。

特点为在体内代谢快，作用维持时间短。临床上用于治疗精神分裂症的急性精神运动性兴奋躁狂状态。

也利用本药的安定作用及增强镇痛作用之特点，将其与强镇痛药芬太尼

一起静脉注射，可使病人产生一种非凡麻醉状态（精神恍惚

、活动减少、不入睡、痛觉消失），称为神经安定镇痛术。

用于外科麻醉，可进行某些小手术，如烧伤大面积换药，各

种内镜检查及造影等；亦可作麻醉前给药，具有较好的抗精

神紧张、镇吐、抗休克等作用。用法用量（1）治疗精神分裂

症 1日10～30mg，分1～2次肌注。（2）神经安定镇痛 每5mg

加芬太尼0.1mg，在2～3分钟内缓慢静注，5～6分钟内如未达

一级麻醉状态，可追加半倍至1倍剂量。（3）麻醉前给药 手

术前半小时肌注2.5～5mg。注重事项同氯丙嗪。100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com

www.100test.com