

二甲弗林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022_E4_BA_8C_E7_94_B2_E5_BC_97_E6_c22_310730.htm 药品名称二甲弗林药物别名（回苏灵）英文名称Dimefline 类别中枢兴奋药性状常用其盐酸盐，为白色结晶性粉末；几乎无臭；味极苦。在水中易溶，在乙醇中溶解，在乙醚中几乎不溶。制剂片剂：每片8mg。注射液：每支8mg（2ml）。分子式成分药理及应用对呼吸中枢兴奋作用较强，作用比尼可刹米强100倍，清醒率可达90%～95%。用于各种原因引起的中枢性呼吸衰竭、麻醉药、催眠药所致的呼吸抑制及外伤、手术等引起的虚脱和休克。用法用量口服，1次8～16mg，1日2～3次。肌内或静脉注射，每次8mg。静脉滴注，1次8～16mg，以注射用氯化钠溶液或葡萄糖溶液稀释。注意事项（1）副作用有恶心、呕吐、皮肤烧灼感等。剂量过大，可引起肌肉震颤、惊厥等。（2）剂量过大时易引起惊厥，应预备短效巴比妥类（如异戊巴比妥），作惊厥时急救用。（3）静注速度必须缓慢，并应随时注重病情。（4）有惊厥病史、肝肾功能不全者及孕妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com