

泛昔洛韦 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B3_9B_E6_98_94_E6_B4_9B_E9_c22_310752.htm 药品名称泛昔洛韦药物别名海正韦克 英文名称famciclovir 类别抗病毒药制剂片剂：125mg/片。药理毒理本品为核苷类化合物，在体内迅速转化为有抗病毒活性的化合物喷昔洛韦，后者对I型单纯疱疹病毒（HSV-I）、II型单纯疱疹病毒（HSV-2）以及水痘带状疱疹病毒（VZV）有抑制作用。适应症带状疱疹和原发性生殖器疱疹。不良反应头痛和恶心。相互作用与丙磺舒或其它由肾小管主动分泌的药合用时，可能导致本药的血浓度升高。与其它由醛类氧化酶催化代谢的药物可能发生相互作用。用法用量成人每次250 mg，每日3次口服，连用7天。用药过量：若过量服用，可采用对症和支持疗法予以处理，体内的喷昔洛韦可采用血液透析法清除。注重事项对泛昔洛韦过敏者禁用。泛昔洛韦对预防生殖器疱疹的复发、股部带状疱疹、播散性带状疱疹及免疫缺陷患者的疗效尚未得到确认。肾功能不全患者应注重调整用法与用量。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com