

贝美格 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B4\\_9D\\_E7\\_BE\\_8E\\_E6\\_A0\\_BC\\_c22\\_310758.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E8_B4_9D_E7_BE_8E_E6_A0_BC_c22_310758.htm) 药品名称贝美格药物别名（美解眠，Megimide）英文名称gemegdde〔 〕类别中枢兴奋药性状白色或近白色结晶性粉末或片状结晶。无臭、味苦。可溶于水（1:170）、乙醇（1:30）。其0.5%水溶液pH为5~6.5。制剂注射液：每支50mg（10ml）。药理及应用中枢兴奋作用类似戊四氮，对巴比妥类及其他催眠药有对抗作用。用于解救巴比妥类、格鲁米特、水合氯醛等药物的中毒。亦用于加速硫喷妥钠麻醉后的恢复。因本品作用快，多采用静滴，常用量0.5%10ml（50mg），用5%葡萄糖注射液稀释静滴。亦可静注，每3~5分钟注射50mg，至病情改善或出现中毒症状为止注重事项（1）静滴时不可太快，以免惊厥；注射量大，速度过快可引起恶心、呕吐，反射增强、肌肉震颤及惊厥等。（2）本品迟发毒性表现为情绪不安、精神错乱、幻视等。（3）注射时须预备短时巴比妥类药，以便惊厥时解救。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)