

氨乙异硫脲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_A8_E4_B9_99_E5_BC_82_E7_c22_310765.htm 药品名称氨乙异硫脲
药物别名（克脑迷，抗利痛，ANTIRADON，AET

，SURRECTAN）英文名称Aminoethylisothiourea 类别中枢兴奋药性状常用其双溴盐，为白色针状结晶性粉末，易溶于水，可溶于5%葡萄糖溶液。制剂注射用氨乙异硫脲：每支1g。分子式成分药理及应用本品在体内能释放具有活性的巯基而促进脑细胞代谢，能使外伤性昏迷病人迅速地恢复脑的功能，并有对抗中枢抑制药的作用。用于外伤性昏迷、脑外伤后遗症，其它原因引起的昏迷，一氧化碳中毒、脑缺氧、巴比妥类、地西洋等的中毒及放射性损伤。用法用量静滴：成人1日1g，溶于5%~10%葡萄糖溶液250~500ml中，以每分钟40滴的滴速滴注。对虚脱病人，开始可按每分钟100滴，连续5分钟，同时注重观察病情，如病人心跳过缓、呼吸过快，面部发红，上半身发红及腹痛，滴速应减至每分钟40滴左右或立即停药。一般疗程为9~12天，治疗可以持续一个多月。注重事项（1）静脉滴注后，有时可能引起静脉炎或猩红热样皮疹，间有发热，一般停药后即可自愈，或使用可的松类药物减轻或消除副作用。滴注时应防止药液注于静脉外。（2）孕妇、产妇及严重冠心病者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com