

罗拉碳头孢 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BD\\_97\\_E6\\_8B\\_89\\_E7\\_A2\\_B3\\_E5\\_c22\\_310781.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_BD_97_E6_8B_89_E7_A2_B3_E5_c22_310781.htm) 药品名称罗拉碳头孢  
药物别名Lorabid 英文名称Loracarbef 类别四代头孢制剂胶囊  
：每粒200mg；400mg。 药理毒理本品的抗菌活性与头孢克罗、头孢呋新酯相似，对绝大多数革兰阳性球菌，包括A族链球菌、肺炎链球菌和对甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌（但MRSA除外）均有活性。本品对流行性感嗜血杆菌、卡他莫拉菌包括大多数产生β-内酰胺酶的菌株和大多数大肠杆菌、肺炎克雷伯杆菌、奇异变形杆菌、沙门菌属和痢疾志贺菌也均有活性。但肠杆菌属、沙雷菌属、假单胞菌属、普通变形杆菌和脆弱类杆菌一般均耐药。药动学口服本品后约有90%的药量可由胃肠道吸收，成人1次口服200mg或400mg后，平均血药浓度峰值分别为8.14mg/L达峰时间为1.2h本品以药物原形由尿中排泄，半衰期约1h，肾功能不全的病人半衰期明显延长。适应症敏感菌所引起的肺炎、急性支气管炎、咽喉炎、扁桃体炎、肾盂肾炎、中耳炎、皮肤及软组织感染。不良反应常见的不良反应有腹泻、头痛。用法用量口服：成人每12h200~400mg，儿童每12h7.5~15mg/kg，于饭前1h或饭后2h服用。对肾功能损害病人要降低剂量。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)