

酮洛酸氨丁三醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E9_85_AE_E6_B4_9B_E9_85_B8_E6_c22_310811.htm 药品名称酮洛酸氨丁三醇药物别名痛力克、三羟甲基氨基甲烷，缓血酸铵 英文名称Ketorolac Tromethamine 类别镇痛药制剂针剂：1ml：30mg。片剂：10mg。药理毒理本品为非钠的氨基缓冲碱。在体液中可与水起反应，而使其减少。药动学口服或肌注均能迅速吸收，口服后T_{max}约30min~40min，肌注后约T_{max}约50min。血浆蛋白结合率达99%，血浆T_{1/2}约4h~6h，老年患者或肾功能损害者T_{1/2}延长。适应症手术引起的中度至重度的疼痛及癌肿疼痛、肾绞痛等。不良反应有腹部不适、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，偶有可逆性抑制血小板功能。用法用量肌肉注射，开始30mg~60mg/次，以后15mg~30mg/6h，最大量120mg/日，连续用药不超过2日。口服，成人10mg/次，1次~4次/日；剧痛时增至20mg/次，3次~4次/日。注重事项妊娠B类，孕妇及18岁以下者禁用。消化道溃疡、肾功能损害、出血性疾病及接受香豆素治疗的病人慎用，老年患者及肾病患者应减量使用，100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com