

头孢唑南 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E5\\_94\\_91\\_E5\\_c22\\_310816.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_94_91_E5_c22_310816.htm)

药品名称头孢唑南  
药物别名头孢唑喃钠 Cosmosin 英文名称Cefuzonam 类别四代头孢制剂粉针剂：每支0.25g；0.5g；1g。药理毒理本品为第四代半合成头孢菌素，具广谱抗菌活性，对大肠杆菌、变形杆菌属、克雷白菌属及流感杆菌具强抗菌力。对β-内酰胺酶稳定。药动学成人静注本品1g，血药浓度半衰期为1.08h，主要经肾脏排泄。同时明显向胆汁转运，静注1g后胆汁内药物浓度峰值为307～2550mg/L，胆囊中也有高浓度(192.7mg/L)。本品亦向痰、子宫、卵巢、骨盆腔内渗出液、腹腔渗出液、骨髓、脑脊液等转运，亦有少量向乳汁转运。尿中未发现具有抗菌活性的药物代谢产物。适应症呼吸系统及泌尿系统感染如支气管炎、扁桃体炎、肾盂肾炎、尿路感染、腹膜炎、胆囊炎、胆管炎、肝脓肿、脑膜炎及妇科感染等。不良反应主要为过敏反应，有皮疹、荨麻疹。尚有恶心呕吐及胃肠道反应，腹泻。用法用量静注，成人1g～2g/日，分2次；儿童每日40mg～80mg/kg，分3～4次。静滴可加入输液中，输注时间为0.5～2小时。注重事项对青霉素过敏者及过敏体质者慎用。(1)对本品过敏者禁用；(2)肝肾功能严重不全者、孕妇及新生儿慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)