

氟哌啶醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_9F\\_E5\\_93\\_8C\\_E5\\_95\\_B6\\_E9\\_c22\\_310848.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B0_9F_E5_93_8C_E5_95_B6_E9_c22_310848.htm) 药品名称氟哌啶醇药

物别名氟哌丁苯，氟哌醇，卤吡醇，SERENASE 英文名称Haloperidol 类别丁酰苯类性状白色或类白色的结晶性粉末；无臭，无味。能溶于水。在氯仿中溶解，在乙醇中略溶，在乙醚中微溶，在水中几乎不溶。制剂片剂：每片2mg；4mg。注射液：每支5mg（1ml）。分子式成分药理及应用作用与氯丙嗪相似，作用原理亦相同。特点为：抗焦虑症、抗精神病作用强而久，对精神分裂症与其它精神病的躁狂症状都有效。镇吐作用亦较强，但镇静作用弱。降温作用不明显。口服吸收快，2~3小时血浆浓度达高峰，持续约72小时，然后缓慢下降。肝脏分布较多。约15%由胆汁排出，其余由肾排出。适应症 各种急、慢性、精神分裂症。对吩噻嗪类治疗无效者，本品可能有效。 焦虑性神经官能症。 呕吐及顽固性呃逆。 与哌替啶合用以增强其镇痛作用。用法用量（1）口服用于精神病，1日4~60mg，开始时每次1~2mg，无效时可逐渐增加剂量。用于呕吐和焦虑1日0.5~1.5mm。（2）肌肉注射 1次5~10mg，1日2~3次。（3）静注5mg，以25%葡萄糖液稀释后在1~2分钟内缓慢注入，每8小时1次，如无效可将剂量加倍。如好转可改口服。注重事项（1）多见锥体外系反应，降低剂量可减轻或消失。尚可引起失眠、头痛、口干及消化道症状。（2）大剂量长期使用可引起心律失常、心肌损伤。心功能不全者禁用。（3）有报道肌注后引起呼吸肌运动障碍，应用时应注重。（4）可影响肝脏功能，但停药后可逐渐恢复。（5）与麻醉药、镇痛药、催眠药合

用时应减量。（6）曾有致畸报道，孕妇忌用。（7）基底神经节病变患者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)