

盐酸哌甲酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E5_93_8C_E7_c22_310849.htm 药品名称盐酸哌甲酯
药物别名利他林 Ritalin 英文名称Methylphenidate

Hydrochloride#093. 类别中枢兴奋药制剂片剂：10mg；粉针剂：20mg。 药理毒理本品为中枢兴奋药，直接兴奋延脑呼吸中枢，作用较暖和。 适应症脑功能稍微失调(多动综合征)及消除巴比妥类引起的嗜睡、倦怠，麻醉过深的呼吸抑制，各种忧郁症、神经官能症等。 不良反应常见食欲减退，紧张激动、不易入睡。偶有眩晕，心悸，厌食，头痛，恶心等。注射能引起血压暂时明显升高。儿童长期应用可产生食欲减退、失眠、偶见腹痛、心动过速和过敏。相互作用可减弱巴比妥类、抗组织胺类和抗精神病类药物的作用。用法用量口服，成人，10mg/次，2~3次/日，饭前45分钟服。6岁以上儿童5mg/次，2次/日，早和中餐前服。按需要每周递增5~10mg，1日总量不宜超过60mg。肌注、静滴：10mg-20mg/次，必要时30min后可重复1次。 注重事项妊娠C类。孕妇、青光眼、激动性忧郁或过度兴奋者及6岁以下小儿禁用。癫痫或高血压患者以及6岁以下小儿慎用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com