

膦甲酸钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E8_86_A6_E7_94_B2_E9_85_B8_E9_c22_310858.htm 药品名称膦甲酸钠 英文名称Foscarnet sodium [] 类别抗病毒药制剂输液；每

瓶600mg (250ml) ；1200mg (500ml) 。 分子式成分药理及应用本品为无机焦磷酸盐的有机同系物。在体外有抑制疱疹病毒DNA聚合酶的作用，包括细胞肥大病毒、单纯疱疹病毒HSV-1和HSV-2、人疱疹病毒HHV-6、EB病毒 (EBV) 和水痘-带状疱疹病毒 (VZV) 。 本品的血浆蛋白结合率为14% ~ 17%。按 $57 \pm 6 \text{ mg / kg}$ 量滴注，每日3次，第1日 C_{max} 为573 (213 ~ 1305) $\mu \text{ mol / L}$ ， C_{min} 为78 (< 33 ~ 139) $\mu \text{ mol / L}$ 。连用2周后 C_{max} 变化不大， C_{max} 则为110 (43 ~ 148) $\mu \text{ mol / L}$ 。平均血浆清除率为 130 ± 44 或 $178 \pm 48 \text{ ml / min}$ 。主要用于爱滋病患者的细胞肥大病毒性鼻炎。用法用量初始剂量 60 mg / kg ，每8小时1次，至少1小时恒速滴入，用2 ~ 3周；剂量、给药间隔、连续应用时间须根据病人的肾功能与用药耐受程度予以调节。维持量为每日90 ~ 120 mg / kg ，静滴2小时。肾功能不足者需减量用药。注重事项可引起多系统的不良反应，较常见的有发热、乏力、寒战、衰弱、不适、疼痛、感染、毒血症；头痛、感觉异常、头昏、肌不随意收缩、感觉减退、神经病、癫痫发作；厌食、恶心、腹泻、呕吐、腹痛；贫血、粒细胞减少、白细胞减少，盐电解质失衡 (包括低血钾、低血钙、低血镁、低磷酸盐血症或高磷酸盐血症) ；抑郁、精神错乱、焦虑；咳嗽、呼吸困难；皮疹、多汗；肾功能改变；视觉异常等 (以上发生率在5%以上) 。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

