

丙磺舒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_99\\_E7\\_A3\\_BA\\_E8\\_88\\_92\\_c22\\_310862.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E4_B8_99_E7_A3_BA_E8_88_92_c22_310862.htm) 药品名称丙磺舒药物别名

羧苯磺胺，benemid，probalan 英文名称probenecid 类别抗痛

风药性状白色结晶性粉末；无臭，味微苦。在丙酮中溶解，

在乙醇或氯仿中略溶，在水中几乎不溶；在稀氢氧化钠溶液

中溶解，在稀酸中几乎不溶。【药理及应用】（1）抑制尿酸

盐在近曲肾小管的主动再吸收，增加尿酸盐的排泄而降低血

中尿酸盐的浓度。可缓解或防止尿酸盐结节的生成，减少关

节的损伤，亦可促进已形成的尿酸盐的溶解。无抗炎、镇痛

作用。用于慢性痛风的治疗。（2）可以竞争性抑制弱有机酸

（如青霉素、头孢菌素）在肾小管的分泌，故可以增加这些

抗生素的血浓度和延长它们的作用时间。制剂片剂：每

片0.25g。分子式成分用法用量（1）慢性痛风口服每次0.25g

，每日2~4次，1周后可增至每次0.5~1g，每日2次。（2）增

强青霉素类的作用 每次0.5g，每日4次。儿童：25mg/kg，

每3~9小时1次。注重事项（1）少数病人可见胃肠道反应，

皮疹、发热。治疗初期可使痛风发作加重，是由于尿酸盐由

关节移出所致。同服大量水，并加服碳酸氢钠。可防止尿酸

盐在泌尿道沉积形成尿结石。（2）肾功能低下，对磺胺类药

过敏者及肾功能不全者禁用。不宜与水杨酸类药、阿司匹林

、依他尼酸、氢氯噻嗪、保泰松、吲哚美辛及口服降糖药同

服。（3）伴有肿瘤的高尿酸血症者，或使用溶解细胞的抗癌

药，放射治疗患者，均不宜使用本品，因可引起急性肾病。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)