

磺吡酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A3\\_BA\\_E5\\_90\\_A1\\_E9\\_85\\_AE\\_c22\\_310869.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_A3_BA_E5_90_A1_E9_85_AE_c22_310869.htm)

药品名称磺吡酮药物别名硫氧唑酮，苯磺唑酮，ANTURAN 英文名称Sulfinpyrazone〔 〕类别抗痛风药性状白色粉末，溶于酒精及丙酮，稍溶于稀碱，几不溶于水。制剂片剂：每片0.1g。分子式成分药理及应用（1）竞争性抑制尿酸盐在近由小管主动再吸收，从而增加尿酸从尿中排泄，降低血中尿酸浓度。用于治疗慢性痛风。减缓或预防痛风结节的形成和关节的痛风病变。（2）抑制血小板聚集，增加血小板存活时间。据研究在本品治疗的前6个月中有减少心肌梗死忽然死亡的危险。（3）有微弱的抗炎和镇痛作用。t<sub>1/2</sub>约3小时。大部由肾排泄。用法用量抗痛风：成人口服每次0.1~0.2g，每日2次，剂量可递增至每日400~800mg，时间可用至1周。维持量：每次100~400mg，每日2次。注重事项（1）急性痛风关节炎控制后2周，始可使用本品。（2）与食物同服或同服碳酸氢钠可减少药物对胃肠刺激及减少尿酸在泌尿道沉着。（3）10%~15%病人服后有胃肠道反应。（4）不可与阿司匹林及其它水杨酸盐同服。

（5）有报道，个别病人用药期间可引起肾功衰竭。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)