

芬太尼透皮贴剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8A\\_AC\\_E5\\_A4\\_AA\\_E5\\_B0\\_BC\\_E9\\_c22\\_310871.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E8_8A_AC_E5_A4_AA_E5_B0_BC_E9_c22_310871.htm) 药品名称芬太尼透皮贴剂 药物别名多瑞吉 Durogesic 英文名称Fentanyl Transdermal System 类别镇痛药制剂贴剂 每贴2.5mg(芬太尼)

, 25  $\mu$ g/h, 10cm<sup>2</sup>, 5贴/盒。药理毒理本品为可持续72h释放阿片类止痛剂芬太尼的透明贴剂，主要治疗作用为止痛和镇静。多瑞吉在72h的应用期间可持续地、系统地释放芬太尼，芬太尼的血清浓度与贴剂大小成正比，在首次使用后的24~72h内达峰值。用于癌症止痛治疗。适应症止痛和镇静 不良反应与阿片类药物相关的不良反应：如恶心、呕吐、便秘，低血压，嗜睡，精神错乱，幻觉，欣快，瘙痒及尿潴留。严重的为肺通气不足。偶见皮肤发红、红斑及刺痒。相互作用同时应用其它中枢神经系统抑制剂、安定类药物、骨骼肌松弛剂、镇静性抗组胺药及酒精饮料，可产生成瘾性抑制作用，发生肺通气不足、低血压及深度镇静。因此应对患者非凡护理和观察。用法用量应在躯干或上臂非刺激及非辐射的平整、干燥部位使用，用前用手掌用力按压30秒，更换时，选择另一部位。未使用过阿片类药物的患者应以最低剂量25  $\mu$ g/h为起始剂量。对于阿片类药物耐受的患者，可根据口服或肠外给药量转换成多瑞吉（具体推荐剂量详见说明书）。每72h应更换一次本贴剂，剂量应根据个体情况逐渐增加直至达到止痛效果。注重事项（1）芬太尼过量可出现呼吸抑制。可使用特异性阿片类药物拮抗剂如纳络酮解救。（2）重复使用阿片类药物后可能会出现耐受和机体及心理依靠。（3）

颅内压升高者、心脏病患者、肝肾疾病患者及发烧病人应慎用，必要时需减量。（4）儿童、孕妇及哺乳妇女不推荐使用本品。（5）避免直接与发热原接触，如电热毯、烤灯、强烈日光浴等。（6）可能会影响从事驾车或操纵机器等具有潜在危险工作所需的脑力和/或体力。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)