

盐酸氯普噻吨 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_B0_AF_E6_c22_310895.htm 药品名称盐酸氯普噻吨
药物别名泰尔登，氯丙硫蒯 Tardan，Taractan 英文名
称Chlorprothixene Hydrochloride 类别硫杂蒯类制剂片剂
：12.5mg、25mg、50mg；注射液：1ml：10mg、1ml：30mg。
药理毒理药理作用与氯丙嗪相似，抗精神病作用不及氯丙嗪，
但镇静作用较氯丙嗪强，抗肾上腺素作用及抗胆碱作用弱
药动学口服后T_{max}约1～3h，肌注作用时间可维持12h，主要
在肝脏代谢，大部分经肾脏排泄，T_{1/2}约30h。适应症伴有抑
郁或焦虑症状的精神分裂症、躁狂症、更年期精神病及神经
官能症等。不良反应参见盐酸氯丙嗪，大剂量时偶可引起惊
厥发作。相互作用苯丙胺、胍乙啶、左旋多巴、抗惊厥药物
等可降低本品作用；本品能增强中枢神经抑制药物、三环类
或单胺氧化酶抑制剂及抗胆碱药物的毒性；制酸药或泻药可
减少本品的吸收。本品能掩盖某些抗生素的耳毒性。用法用
量精神病：口服，25mg～50mg/次，3～4次/日；重症600mg/
日；儿童(大于6岁)，12.5mg～25mg/次，3～4次/日。肌内注
射，10mg～30mg/次，1～2次/日；神经官能症：12.5mg
～25mg/次，3次/日。注重事项妊娠、哺乳期妇女、幼儿慎用
。老年人减量。参见盐酸氯丙嗪。100Test 下载频道开通，各
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com