

奈福泮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_A5_88_E7_A6_8F_E6_B3_AE_c22_310907.htm 药品名称奈福泮 别名（平痛新，Bezoxazocline，Fenazoxine，ACUPAN）英文名称Nefopam 类别镇痛药 性状常用其盐酸盐，为白色结晶性粉末；无臭，味微苦。在水中略溶，在乙醇中微溶，在苯中不溶。制剂片（胶囊）剂：每片（胶囊）20mg。注射液：每支20mg（1ml）；20mg（2ml）分子式成分药理及应用本药为一种新型镇痛药，化学结构属于环化邻甲基苯海拉明。所以不具有非甾体抗炎药的特性，亦非阿片受体激动剂。对中、重度疼痛有效，肌注本品20mg相当12mg吗啡效应。对呼吸、循环系统无作用。口服15～30分钟后迅速吸收，第一关卡效应明显。 $t_{1/2}$ ～8小时。由肝代谢而失去药理活性。无耐受和依赖性。用于术后止痛、癌瘤痛、急性外伤痛。亦用于急性胃炎、胆道蛔虫症、输尿管结石等内脏平滑肌绞痛；局部麻醉、针麻等麻醉辅助用药。用法用量1）口服：1次20～60mg；1日80～180mg。（2）肌注或静注：1次20mg，必要时每3～4小时1次。注意事项（1）产生作用时常有瞌睡、恶心、出汗、口干、头晕、头痛等。但一般持续时间不长。如过量可引起兴奋，宜用安定解救。（2）严重心血管疾病、心肌梗死或惊厥者禁用；青光眼，尿潴留和肝、肾功能不全患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com