

头孢孟多 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E5\\_AD\\_9F\\_E5\\_c22\\_310911.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_AD_9F_E5_c22_310911.htm) 药品名称头孢孟多

药物别名甲酰苄四唑头孢菌素钠、先锋羧苄唑、头孢羧唑、羧苄唑头孢菌素、注射用猛多力 英文名称Cefamandole 类别四代头孢药理毒理本品为半合成第二代头孢菌素，抗菌谱与头孢噻啶相似，对革兰阳性球菌不如头孢噻啶。本品主要特点是对革兰阴性菌作用强，优于头孢唑啉。对厌氧梭状芽孢杆菌、脑膜炎球菌、淋球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌、流感杆菌及吲哚阳性变形杆菌等作用较强，非凡是对嗜血杆菌属，本品最有效。适应症用于敏感菌所致的各种感染，如呼吸道感染、胆道感染、肾盂肾炎、尿路感染、腹膜炎、败血症及皮肤软组织、骨、关节等感染。由于尿药浓度高，对尿路感染有高效。不良反应1 用药期间饮酒时可发生恶心、呕吐、头痛、面红、低血压及呼吸困难等反应，应忌酒。2 偶可致过敏反应，有荨麻疹及药物热等，对头孢菌素过敏者禁用。过敏体质或对青霉素过敏者慎用。用法用量成人，0.5g~1.0g/次，3~4次/日；儿童，每日50mg~100mg/kg，分次给予。可供静脉注射或深部肌肉注射，可用生理盐水、葡萄糖注射液或0.167mol/L乳酸钠注射液稀释供静滴。如需静注，宜将本品溶于10ml生理盐水中，于3~5分钟内静注。本品1g溶于注射用水或生理盐水中可供深部肌肉注射。注重事项1 肾功能不全者，应减量使用。2 孕妇及3个月以下婴儿慎用。3 肌注可致局部疼痛，偶可产生血栓性静脉炎。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)