

盐酸苯海索 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E8_8B_AF_E6_c22_310940.htm 药品名称盐酸苯海索
药物别名安坦 Benzhexol Artane 英文名称Trihexyphenidyl
Hydrochloride#093. 类别抗震颤麻痹药制剂片剂：2mg、5mg；
胶囊剂：5mg；糖浆剂：5ml：5mg。药理毒理对中枢纹状体
胆碱受体有阻断作用，外周抗胆碱作用较弱，所以不良反应
轻临床用于震颤麻痹，脑炎后或动脉硬化引起的震颤麻痹，
改善震颤明显，但总的疗效不及左旋多巴、金刚烷胺，用于
轻症及不能耐受左旋多巴的患者，对利血平和吩噻嗪类引起
的锥体外系反应有效。药动学口服易吸收，分布广泛。约1h
起效，作用持续6~12h，T_{1/2}为0.2~1.7h，大剂量为0.3~3.7h。
以原形及代谢物形式经肾脏排泄。适应症震颤麻痹(帕金森
病)、脑炎后震颤麻痹综合征(帕金森综合征)的震颤、强直症
状的轻症患者以及对左旋多巴不耐受或无效者。不良反应口
干、视物模糊等，偶见心动过速、恶心、呕吐、便秘等。相
互作用与左旋多巴合用时两药的作用不稳定，应隔开2~3h给
药。可增加强心苷吸收导致中毒。可增加三环类抗抑郁药、
单胺氧化酶抑制药、吩塞秦、抗胆碱能药、金刚烷胺等药的
毒性。用法用量口服，开始1mg~2mg/日，第3~5日内每
日2mg，逐渐加至期望疗效，常用剂量为5mg~15mg/日，3
~4次/日。极量20mg/日。注重事项妊娠C类。不适用于脑内
缺乏乙酰胆碱的帕金森征(痴呆综合征)患者。前列腺肥大
、青光眼、对本品过敏者禁用。100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com