

美施康定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_BE_8E_E6_96_BD_E5_BA_B7_E5_c22_310957.htm 药品名称美施康定
药物别名硫酸吗啡控释片 英文名称morphine sulfate 类别镇痛
药制剂10MG × 10片/盒。分子式成分本药主要成分是硫酸吗啡，其化学名为17-甲基-3-羟基4,5-环氧-7,8-二脱氢吗啡喃-6-醇硫酸盐五水合物，分子式为(C₁₇H₁₉NO₃)
) 2H₂SO₄5H₂O，分子量为758.85。10 mg药片为浅棕色，30 mg为紫色，60 mg为桔红色双凸薄膜衣片，内含适量供药物在体内缓慢释放的阻滞剂。药理毒理硫酸吗啡控释片为强效中枢性镇痛药，作用时间可持续12 hr。本药对呼吸有抑制作用，可引起恶心、呕吐、便秘及排尿困难，长期应用可产生耐受性、身体依靠性和成瘾性。药动学硫酸吗啡控释片由胃肠道粘膜吸收，分布于血流丰富的组织和器官，血药浓度达峰时间为服药后2-3 hr，消除半衰期为3.5 hr，主要在肝脏内分解，通过肾脏排泄。适应症主要用于晚期癌症患者第三阶梯止痛。不良反应可能会出现恶心、呕吐，继续用药过程中可逐渐减轻，适当减量或应用止吐药可缓解。可能发生便秘，可适当服用缓泻剂。长期应用有可能产生耐受性和依靠性。用法用量成人最初应用本药者，宜从每12 hr服用10 mg-20 mg开始，视止痛效果调整剂量，以达到缓解疼痛目的。必须完整吞服、切勿嚼碎。正在服用弱阿片类药物或已服过阿片类药物的患者，可从每12 hr服用30 mg开始，必要时可增加至每12 hr 60 mg。若还需更高剂量时，则可根据具体情况增加25%~50%。对身体虚弱或体重轻于标准的患者，初始剂量应适当减少。老人适当减量。患者如由服用本药改为其它缓释或

控剂型吗啡制剂时，必须重新调整剂量注重事项遮光、密闭、在25 ° C以下保存。颅内压增高者慎用。老年患者、甲状腺机能减退者、肾病及慢性肝病者可适当减量。下列情况禁用：呼吸抑制、瘫痪病人肠胃绞痛、胃排空迟缓、呼吸道阻塞性疾病、肺原性心脏病患者；对吗啡过敏、急性肝炎或肝功能严重障碍，单胺氧化酶使用期间或停用不到2周的患者；孕妇、产妇及哺乳期妇女；麻痹性肠胃绞痛、原因不明的急腹症患者及颅脑损伤患者。本品不适用于儿童。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com