

溴隐亭 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_BA_B4_E9_9A_90_E4_BA_AD_c22_310959.htm 药品名称溴隐亭药物别名

溴麦角隐亭，溴麦亭，溴麦角环肽，Bromoergocriptine

，PARLODOL 英文名称Bromocriptine〔 〕类别抗震颤麻痹

药性状药用其甲磺酸盐（Methanesulphonate），系黄白色

结晶粉末，2.87mg相当于溴隐亭2.5mg。制剂片剂：每

片2.5mg分子式成分药理及应用系多肽类麦角生物碱，选择性

地激动多巴胺（D）受体。一般剂量时激动D₂受体，发挥抗

震颤麻痹作用；小剂量时激动突触前膜D₃受体，使多巴胺释

放减少，可用于治疗Huntington舞蹈病。它可激动垂体细胞

的多巴胺受体，使垂体催乳激素及生长激素释放减少（见

第11章）。口服后60分钟显效，2~3小时达高峰。与血浆蛋

白结合率90%~96%，约90%由胆汁排出，t_{1/2}约48小时。

（1）抗震颤麻痹。疗效优于金刚烷胺及苯海索，对僵直、少

动亦效果好，对重症患者亦效果好，常用于左旋多巴疗效不

好或不能耐受患者，症状波动者，对左旋多巴复方制剂无效

者。特点是显效快，持续时间长。（2）闭经或乳溢。用于各

种原因所致催乳激素过高引起的闭经或乳溢，对于垂体瘤诱

发者，可作为手术或放射治疗的辅助治疗。（3）抑制生理性

泌乳。（4）用于催乳激素过高引起的经前期综合征，对周期

性乳房痛和乳房结节，可使症状改善，但对非周期性乳房痛

和月经正常者几无效。（5）肢端肥大症。（6）女性不育症

。（7）也可用于Huntington舞蹈病。用法用量震颤麻痹：开

始每次1.25mg，1日2次，2周内逐渐增加剂量，每14~28日每

日增加2.5mg，以找到最佳疗效的最小剂量。用于闭经或溢乳

、抑制泌乳、不育症、肢端肥大等的用法见第11章。注重事项（1）如与左旋多巴合用可提高疗效，但应用本品10mg，须减少左旋多巴剂量12.5%。（2）主要不良反应有恶心、头痛、眩晕、倦怠、腹痛、呕吐等。也可出现低血压、多动症、运动障碍及精神症状。不良反应发生率约68%，连续用药后可减轻，与食物同服也可减轻。约有3%需中止用药。（3）用于治疗闭经或乳溢，可产生短期疗效，不宜久用。治疗期间可以妊娠，如需计划生育，应使用不含雌激素的避孕药或其它措施。（4）对麦角生物碱过敏者，心脏病、四周血管性疾病及妇女妊娠期禁用。（5）忌与降压药、吩噻嗪类或H₂受体阻滞剂合用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com