

头孢孟多酯钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_AD_9F_E5_c22_310964.htm 药品名称头孢孟多酯钠 药物别名头孢孟多甲酯钠，头孢羟唑 Cefam，Kefandol 英文名称CefamandoleNafate 类别四代头孢制剂粉针剂：0.5g，1g，2g。(以头孢孟多计) 药动学肌注后Tmax为0.5~1h，分布于许多组织和体液中，脑脊液中浓度低。大部分以原形由肾脏排出。T1/2 为0.5~1h。适应症用于敏感菌所致呼吸系统感染、泌尿系统感染、腹膜炎、菌血症及皮肤软组织、骨和关节等感染。不良反应偶见血栓性静脉炎，血清转氨酶、尿素氮暂时性升高。偶可发生变态反应，如荨麻疹、药物热等。亦可引起出血，注射维生素K可予以纠正。相互作用与氨基甙类抗生素有协同作用，也增加肾毒性，且不宜在同时混合应用。本品可干扰尿糖检测，可出现假阳性反应。用法用量静脉滴注或深部肌肉注射：成人0.5g~2.0g/次，3~4次/日，不宜超过12g/日；儿童每日50mg~150mg/kg，3~4次/日。注重事项妊娠B类。过敏体质或对青霉素过敏患者慎用。用药期间饮酒时可发生恶心、呕吐、头痛、低血压、呼吸困难等双硫仑样反应。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com