

奈莫必利 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_A5_88_E8_8E_AB_E5_BF_85_E5_c22_311004.htm 药品名称奈莫必利药

物别名Emonapride，Emirace 英文名称Nemonapride 类别其他抗精神病药制剂片剂：每片3mg；10mg。分子式成分药理及应用本品具有较强的抗精神病作用，能改善幻觉和妄想等症状，对脱氧麻黄碱和阿扑吗啡引起的刻板行为及运动过度行为有明显抑制，其作用相似于氟哌啶醇，强于氯丙嗪。其作用机制为选择性地抑制脑内D₂-多巴胺受体，且此作用极强，而对 α -肾上腺素受体与M-胆碱受体作用极弱，故而其抗胆碱作用与镇静作用弱，副作用小。本品口服易吸收，2~3小时后即达血药峰浓度，血浆t_{1/2}为2.5~4.5小时。肝脏代谢，肾脏排出。本品适用于治疗精神分裂症。用法用量口服，成人通常每日口服9~36mg，分3次餐后服用。剂量可根据病情及年龄而酌情调节。最大剂量，每日为60mg。注重事项（1）本品常见的不良反应有失眠、焦虑、嗜睡、兴奋、无力、精神抑郁、痉挛发作、头晕、头痛、口干、出汗、尿潴留、便秘、腹泻、皮疹、体重增加或减少，罕见视力模糊。（2）本品还可引起血压升高或降低、心律不齐、心电图异常，出现以上症状应减少剂量或停药，用相应药物治疗。初期常见白细胞增多、血清肌酸磷酸激酶升高、偶见肾功、肝功异常。（3）亦可出现锥体外系反应，此时应减少用量。长期用药可引起不可逆的延迟性运动障碍或内分泌紊乱以致月经失调。（4）昏迷或服用中枢抑制剂者、患巴金森病者禁用。（5）心血管疾病、低血压、有癫痫病史者、肝功异常、营养不良者、孕妇、哺乳期妇女慎用。（6）本品有止吐作用，

可能掩盖中毒、肠梗阻及脑瘤的呕吐症状，应注重。（7）
本品与乙醇或中枢抑制药有相互增强作用，并用时应注重调整剂量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com