

瑞莫必利 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_91\\_9E\\_E8\\_8E\\_AB\\_E5\\_BF\\_85\\_E5\\_c22\\_311014.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_91_9E_E8_8E_AB_E5_BF_85_E5_c22_311014.htm) 药品名称瑞莫必利 英文名称Remoxipride 类别其他抗精神病药制剂胶囊剂：每粒含本品盐酸-水合物75mg、150mg、300mg。控释胶囊：含本品盐酸-水合物150mg、300mg。肌肉注射剂：每支含本品盐酸-水合物100mg（1ml）。口服混悬液：25mg（1ml），含本品盐酸-水合物25mg（1ml）和葡萄糖110mg（1ml）。分子式成分药理及应用瑞莫必利对脑内D<sub>2</sub>-多巴胺受体有较高的选择性阻滞作用，而对5-HT、NA、ACh、组胺与GABA等受体几乎无作用，因此副作用很少。口服后吸收迅速而完全，2小时达血药峰浓度，C<sub>max</sub>和AUC均随比例增加，药动学呈线性变化。生物利用度高，无首过效应，吸收后迅速透过血脑屏障，脑脊液中药物浓度相当于血游离浓度。部分经肝脏代谢，最后经肾脏排出，还可自乳汁排出。血浆t<sub>1/2</sub>为4~7小时。老年患者（71~89岁）的血浆t<sub>1/2</sub>是常人的2倍。本品适用于治疗急性和慢性精神分裂症和以妄想、幻觉和思维紊乱为主要症状的其它精神病。用法用量口服首次剂量为每日300mg，分2次服，可根据个体反应调整剂量。多数使用剂量为每日150~450mg，最大可用至600mg。急性期可肌肉注射，一般不超过1周，最高剂量为天天400mg。控释胶囊：每日300mg，1次服用量可根据个体反应调整，多数为每日150~450mg，个别可用至600mg，每日1次或分2次服。老年人：首次每日剂量150mg，可参照上举范围调整剂量。严重肝肾功能不全者开始150mg，也可调整剂量。注重事项（1）本品不良反应稍微，且多数是暂时的。据报道有恶心、呕吐、头痛、头昏、

体重改变。锥体外系症状比氟哌啶醇少。少见嗜睡、失眠、注重力不能集中、多动、焦虑、口干、便秘、排尿困难、视物模糊等。罕见低血压、男子溢乳与ALT轻度升高。（2）伴有帕金森病和强直的患者、有不稳定性癫痫病史者慎用。

（3）本品有时可加剧病人的兴奋、激动、与攻击状态，必要时应减量。（4）治疗过程中出现不明原因的高热时，应停止用药，找出发热原因。服用本药者，最好不要操作车辆与机器。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)