

甲磺酸溴隐亭 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_94_B2_E7_A3_BA_E9_85_B8_E6_c22_311021.htm 药品名称甲磺酸溴隐亭
药物别名溴隐亭、溴麦亭、溴麦角环肽 Parlodel 英文名
称Bromocriptine Mesilate 类别抗震颤麻痹药制剂片剂：1mg、2.5mg；
胶囊剂：5mg、10mg。药理毒理系多肽类麦角生物碱、选择性地液动多巴胺受体，一般剂量时激动D2受体发挥抗震颤麻痹作用，抗震颤麻痹，疗效优于金刚烷胺及本海索对僵直、少动效果好，对重症患者效果好。本品也是一种催乳激素的抑制剂，用于预防和制止生理性泌乳及伴随的闭经或不排卵。药动学口服Tmax约1.2h，PB为90%~96%。经肝脏代谢，主要通过胆汁排泄，T1/2约0.5h。适应症对左旋多巴治疗无效或不敏感的震颤麻痹。也可用于分娩后，各种原因引起的闭经；抑制泌乳；催产激素引起的乳房肿胀等。不良反应恶心、呕吐、眩晕、竖立性低血压，也可引起下肢血管痉挛、持续性低血压等。大剂量用药可出现红斑性肢痛，幻觉妄想，躁狂抑郁等运动和精神障碍。长期用药可出现皮肤网状青斑、腹膜后和胸膜纤维增生。相互作用与降血压药合用时降压作用增强。用法用量震颤麻痹口服，开始1.25mg/次，2次/日，以后每2周或每月增加1.25mg~2.5mg，直至起效。常用10mg~20mg/日。用于闭经、月经病和低生育力，用量须遵医嘱。用于抑制泌乳：1次0.25mg，1日2次，连服14日。注重事项妊娠C类。严重精神病史和患心肌梗死者禁用，四周血管疾病和消化道溃疡患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com