

枸橼酸芬太尼 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9E\\_B8\\_E6\\_A9\\_BC\\_E9\\_85\\_B8\\_E8\\_c22\\_311023.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_9E_B8_E6_A9_BC_E9_85_B8_E8_c22_311023.htm) 药品名称枸橼酸芬太尼 英文名称Fentanyl Citrate #093. 类别镇痛药制剂注射液：1ml：0.05mg、2ml：0.1mg（均以芬太尼计）。药动学起效快，静注100(g后1min起效，4min达峰，维持17～2h；肌注100(g作用维持1～2h。排泄T<sub>1/2</sub>约3.1～4.4h，血浆蛋白结合率为79%～87%，由肝脏代谢失活。适应症麻醉前、中、后的镇静和镇痛，是目前复合全麻中常用的药物。不良反应偶见眩晕、恶心、呕吐和胆道括约肌痉挛。有弱拟胆碱作用，静注剂量过大或过快，可致胸壁肌强直和延迟性呼吸抑制。相互作用与地西洋并用应减少本品的用量，与肌松药并用应减少其用量，纳洛等能拮抗本品的呼吸抑制和镇痛作用。氟哌利多2.5mg和本品0.05mg的混合液能使病人安静，并对外界环境漠不关心，但仍能合作，肌注少量常作麻醉前给药。用法用量静脉注射，成人全麻初量按体重以芬太尼计分别为：小手术0.001mg～0.002mg/kg，大手术0.002mg～0.004mg/kg，体外循环心脏手术时0.02mg～0.05mg/kg，全麻吸入氧化亚氮时0.01mg～0.02mg/kg，作为局麻镇痛不全的辅助用药0.0015mg～0.002mg/kg。肌肉注射或静脉注射，成人麻醉前用药或术后镇痛按体重0.0007mg～0.0015mg/kg。硬膜外给药，成人手术后镇痛初量0.1mg（加生理盐水稀释到8ml），每2h～4h可重复，维持量每次为初量的一半。2岁～12岁儿童镇痛，按体重0.002mg～0.003mg/kg。注重事项妊娠C类。不宜与单胺氧化酶抑制剂合用，禁用于支气管哮喘、呼吸抑制和重症肌无力病人。药液有一定的刺激性，不得误入气管、支

气管与粘膜接触，也不得涂敷于皮肤和粘膜。本品非静脉全麻药，常伴术中知晓。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)