

头孢唑肟钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_94_91_E8_c22_311033.htm 药品名称头孢唑肟钠
药物别名头孢去甲噻肟，益保世灵、去甲氨噻肟头孢菌素、安普西林、去甲酰氧甲基唑肟头孢菌素、安保速灵 英文名称Ceftizoxime 类别四代头孢制剂粉针剂：1g，2g；注射剂：1g，2g。药理毒理本品为半合成的第三代头孢菌素，抗菌谱较广，与头孢噻肟相似。抗菌谱包括：链球菌属、肺炎球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、变形杆菌及肠细菌属等。药动学肌注T_{max}为1h，广泛分布于多种组织和体液中，约90%以原形经肾排出，T_{1/2}为1.4~1.8h。适应症用于革兰阴性敏感菌所致下呼吸道感染、菌血症、有合并症的泌尿生殖系统感染、胸膜炎、腹内感染等。不良反应偶见皮疹、荨麻疹等变态反应，腹泻等胃肠功能紊乱，可逆性稍微肝功改变等。偶有粒细胞、血小板减少，菌群失调，维生素缺乏，假膜性肠炎等。相互作用丙磺舒可提高血药浓度，延长半衰期。与庆大霉素或妥布霉素等合用有协同作用，但应避免直接混合。用法用量肌肉注射(深部)、静脉注射或静滴：成人1g~6g/日，2~4次/日。儿童(6岁以上)每日40mg~120mg/kg，2~4次/日。注重事项妊娠B类。过敏者禁用。过敏体质及肾功能障碍者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com