

3-乙乌头碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_3-\\_E4\\_B9\\_99\\_E4\\_B9\\_8C\\_E5\\_A4\\_c22\\_311044.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022_3-_E4_B9_99_E4_B9_8C_E5_A4_c22_311044.htm) 药品名称3-乙乌头碱药物别名（新乌宁痛）英文名称3-Acetylaconitine 类别镇痛药性状白色粉末，无臭、味苦，易溶于氯仿，略溶于乙醚，不溶于水。药理及应用动物实验证实，本品可提高痛阈，镇痛作用强于吗啡、阿司匹林。作用出现慢、持久，强度中等。无成瘾性。此外尚有解热作用。服后胆囊分布多，以代谢产物为主由肾脏排泄。用于肩关节四周炎，颈椎病，肩臂痛、腰痛、关节扭伤、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、带状疱疹、小手术术后痛。用法用量口服：每次0.3mg，每日1~2次，饭后服。每次量不超过0.3mg，每日不宜超过2次，服药间隔6小时。1疗程10日，疗程间隔3~5日。肌注：每次0.3mg，每日1~2次，以2%苯甲醇或注射用水稀释至2ml后注射。小儿或老人每日或隔日1次。注重事项（1）少数患者有轻度头晕、恶心、呕吐、双手发麻、胃部烧灼感。个别病人可见心悸、寒战、胸闷、注射局部麻胀痛。上述反应，停药或减量即可消失。（2）出现心电变化时应停药，并用维生素C、高渗葡萄糖及阿托品解救。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)