

盐酸氟奋乃静 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_B0\\_9F\\_E5\\_c22\\_311060.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_B0_9F_E5_c22_311060.htm) 药品名称盐酸氟奋乃静  
药物别名羟哌氟丙嗪 Anatensol，Lyogn 英文名称Fluphenazine  
Hydrochloride 类别长效抗精神病药制剂片剂：2mg、5mg；注射液：1ml：2mg、2ml：5mg。药理毒理抗精神病作用比奋乃静强，且较久，镇静、降低血压作用微弱，但锥体外系反应比奋乃静更多见，用于妄想、紧张型精神分裂症。药动学肌注或皮下注射后1h起效，维持6~8h，主要经肝脏代谢，T<sub>1/2</sub>为14.7~15.3h。适应症精神分裂症。也用于呕吐、焦虑、行为障碍、舞蹈病、神经性疼痛、神经性皮炎等。不良反应参见盐酸氯丙嗪，锥体外系反应多见。用法用量口服，2mg~10mg/日，1~2次/日，最大量20mg/日，维持量为1~5mg/日。深部肌注，1mg~5mg/日。注重事项妊娠C类。孕妇、哺乳期妇女禁用。老年和小儿慎用；对本品过敏、有严重抑郁症状者禁用。抽搐史、脑器质性病变、肝肾心功能不全、白细胞较少、血压较低及有青光眼者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)