

苯海索 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_8B_AF_E6_B5_B7_E7_B4_A2_c22_311064.htm 药品名称苯海索 药物别名安坦，Benzhexol，ARTANE 英文名称Trihexyphenidyl 类别抗震颤麻痹药 性状常用其盐酸盐，为白色轻质结晶性粉末；无臭，味微苦，后有刺痛麻痹感。在甲醇、乙醇或氯仿中溶解，在水中微溶。熔点250~256（分解）。制剂片剂：每片2mg。胶囊剂：每胶囊5mg。分子式成分药理及应用对中枢纹状体胆碱受体有阻断作用，外周抗胆碱作用较弱，约为阿托品的1/10~1/3，因此不良反应轻。临床用于：震颤麻痹，脑炎后或动脉硬化引起的震颤麻痹，对改善流涎有效，对缓解僵直、运动迟缓效较差，改善震颤明显，但总的疗效不及左旋多巴、金刚烷胺。主要用于轻症及不能耐受左旋多巴的患者。常与左旋多巴合用。药物利血平和吩噻嗪类引起的锥体外系反应（迟发运动失调除外）。肝豆状核变性。用法用量常用量，口服，开始时一日1~2mg；逐日递增至一日5~10mg，分次服用。对药物引起的锥体外系反应：口服开始每日1mg，并渐增剂量直至每日5~15mg。极量，口服，一日20mg。注重事项（1）老年人对药物较敏感，注重控制剂量。（2）常见的不良反应有口干、便秘、尿潴留、瞳孔散大、视力模糊等抗胆碱反应。（3）青光眼病人禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com