

金刚烷胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_87_91_E5_88_9A_E7_83_B7_E8_c22_311096.htm 药品名称金刚烷胺药

物别名金刚胺，三环癸胺，SYMMETREL 英文名

称Amantadine 类别抗震颤麻痹药性状常用其盐酸盐，为白色闪光结晶或结晶性粉末；无臭，味苦。在水或乙醇中易溶，在氯仿中溶解。水溶液pH3.5~5。制剂片剂：每片100mg。胶囊剂：每胶囊100mg。糖浆剂：100mg/ml。分子式成分药理及应用（1）进入脑组织后可促进释放多巴胺，或延缓多巴胺的代谢而发挥抗震颤麻痹作用。对震颤麻痹有明显疗效，缓解震颤、僵直效果好。起效快，用药后48小时作用明显，2周后达高峰， $t_{1/2}$ 10~28小时，药物以原形由肾排出，酸性尿排泄加速。（2）抗亚洲A-型流感病毒作用。对该型流感接触者保护率约70%。（3）退热作用，对多种炎症、败血症、病毒性肺炎等与抗生素合用退热作用比单用抗生素好。用于不能耐受左旋多巴治疗的震颤麻痹患者；用于亚洲A-型流感、病毒性感染发热患者。用法用量口服：成人每次0.1g，早晚各1次，最大剂量每日400mg。小儿用量酌减，可连用3~5日，最多10日。1~9岁小儿每日3mg/kg，最大用量不超过150mg/日。注重事项（1）不良反应少，少数病人服后可有嗜睡、眩晕、抑郁、食欲减退等，亦可出现四肢皮肤青斑，踝部水肿等。（2）震颤麻痹患者超过200mg/d时，疗效不增，毒性渐增。老年患者耐受性低，可出现幻觉谵妄。（3）精神病、脑动脉硬化、癫痫、哺乳妇女慎用。可致畸胎，孕妇禁用。肾功能不良者酌减剂量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com